

### **INDICACIONES POSTOPERATORIAS INMEDIATAS – BLEFAROPLASTIA**

#### 1. Medicación.

- ✓ Cefalexina 1 gm.

Tomar 1 (un) comprimido Vía Oral cada 12 hs. hasta terminar la caja.

- ✓ Dioxaflex Gestic (Diclofenac + Paracetamol)

Tomar 1 (un) comprimido Vía Oral cada 8hs., las primeras 48 hs.

Horarios fáciles como 8/16/24 hs. Luego empezar a espaciar las tomas cada 12 o 24hs según dolor.

- ✓ Ketorolac sublingual

Es un analgésico de refuerzo. Solo si hay dolor, colocar 1 (un) comprimido debajo de la lengua entre las tomas de Dioxaflex Gestic. Máximo tres por día.

#### 2. Posición para dormir.

Dormir con 2 almohadas en la espalda, ligeramente semisentada. En esta posición las primeras 48 hs.

#### 3. Frío.

Preparar un té en un bowl y llenar de cubitos de hielo. Humedecer en el té frío algodón o toallitas desmaquillantes y aplicar en los ojos. Cambiarlas manteniéndolas frías permanentemente. Cuanto más, mejor, las primeras 48 hs.

#### 4. Evolución.

Como en cualquier operación es esperable que los tejidos se inflamen y se vean moretones. La inflamación produce tensión y por lo tanto molestias. La inflamación es máxima a las 48/72 hs. y va disminuyendo con el paso de los días.