

**Dr. Martín Colombo -  
Dr. Fernando Rives**

**Indicaciones Postoperatorias Inmediatas  
Lipoaspiración**

1- Medicación

*Cefalexina 1 gm.*

Tomar 1 (un) comprimido Vía Oral cada 12 hs. hasta terminar la caja.

*Dioxaflex Gesic (Diclofenac + Paracetamol)*

Tomar 1 (un) comprimido Vía Oral cada 8 hs., las primeras 48 hs.

Horarios fáciles como 8/16/24 hs.

Luego empezar a espaciar las tomas cada 12 o 24hs según dolor.

*Ketorolac sublingual*

Es un analgésico de refuerzo. Solo si hay dolor, colocar 1 (un) comprimido debajo de la lengua entre las tomas de Dioxaflex Gesic. Máximo tres por día.

2- Posición para dormir.

Dormir con 2 almohadas, ligeramente semisentada.

3- Faja.

Debe sentirse ajustada. La faja habitualmente tiene tres filas de ganchos para regular la compresión. Si aprieta mucho, se puede aflojar.

No quitar.

Es normal que se manche con sangre, después del primer control en consultorio se va a poder quitar por un rato, para lavar.

4- Movilidad.

Puede caminar y movilizarse por la casa sin hacer esfuerzos ni levantar cosas pesadas. Cuanto más se mueva más posibilidad de que se inflame. La inflamación puede producir más molestias por tensión en la piel.

#### 5- Frío.

Aplicar packs fríos del congelador sobre la zona tratada las primeras 72 hs.

Esto sirve para evitar que estas zonas se inflamen. Después de las 72hs continuar con frío solamente si siente que este produce alivio.

#### 6-Evolución

Como en cualquier operación es esperable que los tejidos se inflamen y se vean moretones. La inflamación produce tensión y por lo tanto molestias. La inflamación es máxima a las 48/72 hs. y va disminuyendo con el paso de los días. Las primeras dos semanas es esperable que los pacientes noten no solo inflamación de las zonas tratadas sino también de manos, pies y abdomen. Es por esto que es habitual que la ropa quede ajustada o que en la balanza vea que pesa más. También es esperable que los moretones se desplacen hacia zonas más distales (hacia abajo), lo que ocurre por ley de gravedad.

#### 7- Primer control.

Llamar y pedir turno en el consultorio donde prefiera

Fecha y hora:

Lugar:

En el primer control se retirará la faja para ver la evolución. Se colocará nuevamente y la va a utilizar mínimo 3 semanas. Ese día se podrá duchar al regresar a su domicilio.

No puede manejar.

#### 7- Teléfonos de contacto:

Sanatorio Finochietto 3752 8000 / 3752 8100

Dr. Martin Colombo 15 6100 4177

Dr. Fernando Rives. 15 5736 9123

#### **Consultorio Capital Federal:**

Av. Santa Fe 2036 1 A

Teléfono: 4821-2721/20/19



**Consultorio San Isidro**  
Acassuso 96 (esquina Alem)  
Teléfono: 4743-1115